



Liposukcja Ultradźwiękowa – Kawitacyjna jest zabiegiem, który polega na rozbijaniu ultradźwiękami tkanki tłuszczowej. Fale ultradźwiękowe szybko i trwale niszczą komórki tłuszczowe. Wytworzona energia kawitacyjna, powoduje uszkodzenie błony komórkowej, a uwolniony tłuszcz w postaci płynnej jest transportowany przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulega przemianie materii, a następnie zostaje wydalany. Jest doskonałą alternatywą dla liposukcji chirurgicznej, lecz jest to metoda bezinwazyjna, która pomaga zredukować miejscowy nadmiar tkanki tłuszczowej. Skóra po serii zabiegów jest jędrniejsza, zagęszczona a jednocześnie brak jest uciążliwych efektów ubocznych.

Zalety liposukcji kawitacyjnej:

- miejscowa redukcja tkanki tłuszczowej,
- efekty widoczne już po pierwszym zabiegu (po jednym zabiegu można zaobserwować utratę centymetrów w obwodzie ciała),
- krótki czas trwania zabiegu,
- nie wymaga znieczulenia oraz specjalnego przygotowania pacjenta,
- jest bezbolesna i stanowi alternatywę dla liposukcji chirurgicznej,
- nie powoduje uszkodzeń skóry, otaczających tkanek, naczyń krwionośnych i włókien nerwowych,
- skóra po zabiegach pozostaje jędrna i zwarta.

Jakie są odczucia podczas zabiegu?

Zabiegi są nieinwazyjne i bezbolesne, mogą być wykonywane również na skórze wrażliwej.

Postępowanie po zabiegu:

Po zabiegu zaleca się wykonanie zabiegu drenującego (dermomasaż). Wspomoże to i ułatwi wydalanie z organizmu toksyn oraz zniszczonych komórek tłuszczowych.

Jak wygląda kuracja?

Zabiegi wykonuje się w serii 5 do 10 zabiegów wykonywanych raz w tygodniu.

Wskazania:

- redukcja tkanki tłuszczowej, wyszczuplenie,
- zmniejszenie obwodu nawet o 2 rozmiary,
- modelowanie sylwetki,
- ujędrnienie skóry,
- pobudzenie krążenia,
- odżywienie skóry,
- poprawa elastyczności skóry,
- wysmuklenie sylwetki,
- stymulacja przemiany materii.



Przeciwwskazania :

- ciąża i okres laktacji,
- choroba nowotworowa (do 5 lat po zakończeniu kuracji),
- niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze,
- choroby wirusowe i bakteryjne skóry, przerwana ciągłość naskórka,
- gorączka, osłabienie i wycieńczenie organizmu,
- osteoporoza,
- obecność w okolicy zabiegowej ciał obcych metalicznych i implantów,
- epilepsja, stwardnienie rozsiane,
- menstruacja,
- cukrzyca,
- rozrusznik, zastawka serca,
- choroby wątroby,
- choroby tarczycy (nadczynność i niedoczynność).

Zalecenia do zabiegu / po zabiegu:

- dwa dni przed zabiegiem oraz dwa tygodnie po należy zredukować w diecie ilość tłuszczów i węglowodanów,
- należy przyjmować co najmniej 2 l wody na dobę (wspomaganie metabolizmu trójglicerydów w wątrobie),
- zwiększenie aktywności fizycznej.